



# Grandes Cultures

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

DLP 08-11-20018063

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bulletins techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 6 du 06 Mai 1999  
Rédigé en collaboration avec la Ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

### BLES

Beaucoup de parcelles sont au stade "apparition des barbes au sommet de la tige", la gaine commence à se fendre. Selon nos conseils antérieurs des 21 et 28 Avril, ces cultures ont dû être traitées contre le complexe parasitaire.

Pour celles non encore protégées (plus tardives) au stade F1 étalée, une application est impérative dès que possible car la Rouille brune en particulier va connaître une phase explosive habituelle favorisée par les conditions météo actuelles.

La Rouille brune atteint les feuilles supérieures de même que la Septoriose, plus concentrée dans la partie ouest de la zone. L'oïdium est toujours présent même si les pluies fréquentes l'ont quelque peu lessivé; l'humidité persistante et un retour du beau temps lui seront à nouveau favorables.

Sur variétés non sensibles où en cas d'absence d'oïdium intervenez avec

**Païndor 0.33 l/ha** ou

**Opus 1 l**

sinon préférez

**Capitole 1.5 l**

#### Rouille jaune

Présente déjà sur les blés tendres (variété Victo en particulier) cette maladie est apparue maintenant sur les blés durs et est signalée sur plusieurs parcelles de la variété Acalou. Les traitements conseillés la contrôleront; nous vous rappelons que la découverte de cette Rouille nécessite immédiatement une intervention, son extension est très rapide et très dommageable.

### POIS

Ces cultures sont en début floraison pour la plupart.

Avec les conditions météo très humides les maladies, en particulier les Anthracoses, commencent à apparaître.

Une protection s'impose avec

**Cicéro 2 l/ha** ou

**Walabi 2 l**, cette spécialité plus active sur Botrytis est à préférer pour une 2° intervention fin floraison.

Les Pucerons sont également bien présents dans les boutons floraux; utilisez une spécialité contenant du pyrimicarbe

**Best 1.25 l/ha**

**Karaté K 1.25 l**

►  
**POIS: protection fongicide et insecticide**

►  
**BLES: rappel traitement F1 sur complexe parasitaire**

**Attention: Rouille jaune sur blés durs Acalou**

#### Mesures réglementaires ....

##### Interdiction du Gaucho sur Tournesol:

Comme vous l'avez sûrement constaté, le Gaucho fait l'objet d'un retrait provisoire d'autorisation de mise sur le marché pour l'usage traitement de semences de Tournesol; il n'est donc pas possible d'utiliser des semences traitées en 1999.

DRAF  
Service Régional de la  
protection des  
Végétaux  
ZAC D'ALCO-BP3056  
34034 MONTPELLIER  
CEDEX 01  
Tél: 04.67.10.19.50  
Fax: 04.67.03.10.21

Antenne Carcassonne  
Chemin de la Jasso  
Plaine Mayrevielle  
11000 CARCASSONNE  
Tél: 04.68.71.18.58  
Fax: 04.68.47.46.45

Imprimé à la station  
d'Avertissements  
Agricoles de Languedoc  
Roussillon  
Directeur gérant:  
M.FREYDIER  
Publication périodique  
C.P.A.P. N° 531 AD  
ISSN N° 0298-6582